

Abicin® 30% Pihkalakka

Tieteellisesti tutkittu, tehokas paikallishoito lievän ja keskivaikean kynsisienen hoitoon sekä kynsivallin tulehdukseen.

- CE-merkitty ja Valviran rekisteröimä lääkinnällinen itsehoitovalmiste.
- Useissa *in vitro* -tutkimuksissa on osoitettu, että kuusen pihkan ainesosat ovat laajakirjoisesti antimikrobisia ja antifungaalisia.
- Abicinin teho kynsisienen hoitoon tutkittu kliinisissä potilaskokeissa.

Abicin® 30% Pihkalakka on reseptivapaa lääkinnälliseen käyttöön kehitetty kynsilakka. Lakka sisältää Repolarin ainutlaatuisella menetelmällä kylmänä puhdistamaa suomalaista metsäkuusen (*Picea abies*) pihkaa.

Dermatofyytit eli siltsasienet aiheuttavat yli 90% ihmisen ihon ja kynsien sieni-infektioista. Abicinin teho on tutkitusti voimakkain juuri näitä sieniä vastaan.

Abicin® 30% Pihkalakkaa on helppo käyttää. Hyvän hoitotuloksen varmistamiseksi riittää, että lakkaa sivellään kynsiin ohut kerros 2 kertaa viikossa. Lakka kuivuu noin 15 minuutissa. Kynsisienen hoito vaatii aina kärsivällisyyttä. Hoitoa tulee jatkaa, kunnes uusi terve kynsi on kasvanut vaurioituneen sienikynnen tilalle.

Bakteeriperäisissä kynsivallintulehduksissa lakkaa levitetään iholle päivittäin, kunnes iho on rauhoittunut.



Abicin® 30% Pihkalakka

Abicin® 30% Pihkalakan antifungaalinen ja antibakteerinen teho on osoitettu sekä *in vitro*- että kliinisillä tutkimuksilla. Abicin® 30% Pihkalakka on tehokas tavallisimpia ihmisen ihon ja kynsien sieni-infektioita aiheuttavia dermatofyyttejä eli rihmasieniä eli silsasieniä vastaan. Antifungaalinen teho kattaa *Trichophyton*-, *Microsporum*- ja *Epidermophyton* -sukujen dermatofyytit. Abicin® 30% Pihkalakka tehoaa erinomaisesti myös useimpiin kynsivallintulehdusta aiheuttaviin bakteereihin kuten *Stafylokokkeihin* ja *Streptokokkeihin*.

Kynsisieni (kynsisilsa, onykomykoosi, *tinia unguium*) on hankalahoitoinen kynsilevyn alaisen ihon keratiini-kerroksen sairaus, jonka esiintyvyys on noin 8-11% suomalaisessa aikuisväestössä. Lapsilla kynsisieni on harvinainen. Tavallisimmin kynsisieni todetaan varpaankynsissä, harvemmin sormenkynsissä. Hoitamaton kynsisieni aiheuttaa kynnen paksuuntumista, haurastumista, lohkeilua ja kellertymistä. Kynsisienestä aiheutuva haitta ei ole pelkästään esteettinen, sillä vaurioitunut ja sairas kynsi voi toimia myös bakteerien ns. infektioporttina elimistöön.

KÄYTTÖOHJE

Kynsisienen hoidon alussa, lakan imeytymisen parantamiseksi suosittelemme hoidettavan kynnen ohentamista ja karhentamista. Tämän voi tehdä joko itse viilaamalla tai jalkahoitajan toimesta. Abicin® 30% Pihkalakkaa sivellään suihkun jälkeen pyyhekuiviin kynsiin ja kynsinauhoihin kahdesti viikossa, kunnes kynnet ovat parantuneet. Kynsisienen paikallishoito kestää tavallisesti 3-12 kuukautta, kynnen kasvuvauhdista riippuen. Vanha lakka on hyvä poistaa aika ajoin etanolipohjaisella desinfektioaineella tai kynsilakanpoistoaineella. Ajoittainen kynsien karhennus viilaamalla tehostaa myös lakan imeytymistä kynsilevyn alle.

Bakteeriperäisissä kynsivallintulehduksissa lakkaa tulee levittää iholle ja kynsiin kerran päivässä, kunnes tulehdus on parantunut ja oireet ovat helpottaneet.

Älä käytä Abicinia, jos olet allerginen hartsille (colophonium) tai valmisteeseen muille ainesosille.

Myynti kuluttajille apteekeista.

TILAUKSET

tilaukset@repolar.com tai +358 40 7171 761

Myyntierä 12 x 10 ml pullo

REPOLAR
PHARMACEUTICALS

Repolar Pharmaceuticals Oy
Suomalaistentie 7
02270 Espoo
040 717 1761
info@repolar.com
www.repolar.com

