

ABICIN® 30% Pihkalakka

Lue tämä pakkauseloste huolellisesti ennen käyttöä.
Lakkaa käytetään ulkoisesti paikallishoitoon.

Kotitekoisia pihkavalmisteita on Suomessa perinteisesti käytetty erilaisten iho- ja kynsiongelmiin hoitoon. Pihkan sisältämällä komponenteilla on tieteellisesti osoitettu voimakas antimikrobinen ja antifungaalinen vaikutus. **Abicin® 30% Pihkalakka** on suomalaisen metsäkuusen (*Picea abies*) pihkan ja lääkinnälliseen käyttöön kehitetyn kynsilakan seos. Lakan pihkapitoisuus on 30% valmistusaineista. Lakan sisältämä raakapihka on puhdistettu Repolar Oy:n patentoimalla puhdistusmenetelmällä. Abicin® 30% Pihkalakan koostumus, puhtaus sekä biologinen ja antimikrobinen teho tutkitaan jokaisesta valmistuserästä.

Vaikuttavat aineet:

Puhdistettu metsäkuusen (*Picea abies*) runkopihka.

INCI:

Norway spruce (*Picea abies*) resin, Alcohol denat., Monopropylenglycol, Glycerin.

Käyttökohteet:

Kynsisien, jalkasien ja bakteeriperäisen kynsivallintulehduksen paikallishoitoon.

Käyttöohje (www.repolar.com):

Kynsieni: Riittävä teho kynsientä vastaan edellyttää pihkalakan sisältämien ainesosien imeytymistä kynnen sisään. Tämän vuoksi lakka ei levittämisen jälkeen kovetu heti vaan jähmettyy noin 30 minuutissa. Ennen lakan levittämistä kynsi pestään (pehmenetään) ja kuivataan. Lakkaa levitetään korkin siveltimellä ohuelti koko kynnelle. Paksuuntuneen kynnen ohentamiseksi suosittelemme käyntiä jalkahoitajan vastaanotolla. Lakkaa käytetään kerran päivässä kunnes kynsi on kokonaan parantunut (keskimäärin 9-12 kuukautta). Älä käytä irtokynsiä tai kosmeettisia kynsilakkoja Abicin® hoidon aikana. Lakkaa ei poisteta kynneltä. Tarvittaessa kynnen pintaa voi kevyesti karhentaa esim. hiekkapaperiviilalla, jolloin lakka imeytyy paremmin.

Jalkasila: Jalkasilsan hoidossa lakkaa levitetään hoidettavalle alueelle kerran päivässä kunnes iho on parantunut.



= Säilyvyys 12 kk avattuna.

Kynsivallintulehdus: Bakteeriperäisessä kynsivallintulehduksessa lakkaa levitetään hoidettavalle alueelle kerran päivässä kunnes tulehdus on parantunut. Hakeudu lääkäriin, jos infektio pahenee tai uusiutuu hoidon aikana.

Säilytys/säilyvyys:

Säily huoneenlämmössä avattuna yhden vuoden ajan ja avaamattomana vähintään viiden vuoden ajan. Pulloa tulee ravistella ennen käyttöä.

Raskaus ja imetys:

Mahdollisista haitoista raskauden ja imetyksen aikana ei ole tutkimustietoja.

Yhteisvaikutukset:

Kliinisesti merkittäviä yhteisvaikutuksia ei ole tiedossa.

Vaikutus ajokykyyn:

Ei vaikuta ajokykyyn eikä koneiden käyttöön.

Haittavaikutukset:

Abicin® 30% Pihkalakan mahdollinen haittavaikutus on pihkan sisältämien hartsiyhdisteiden aiheuttama allerginen reaktio, joka ilmenee ihon paikallisena ärtymisenä hoidettavalla alueella. Hartsiallergian esiintyvyyden arvioidaan olevan suomalaisväestössä noin 1-3%. Mikäli allergisia iho-oireita ilmenee, on pihkalakan käyttö lopetettava välittömästi. Muita tunnettuja vasta-aiheita ei ole. Mahdollisista haittavaikutuksista, yhteisvaikutuksista tms. pyydetään tiedottamaan valmistajalle.

Valmistaja:

Repolar Oy
Tietäjäntie 12 B, 02130 Espoo
PL 26, 02101 Espoo
www.repolar.com
asiakaspalvelu@repolar.com
Tel: +358 40 717 1761

